МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ИНСТРУКЦИЯ

ПО МЕДИЦИНСКОМУ ПРИМЕНЕНИЮ ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА

ГЛИЦИФОН®

Регистрационный номер: ЛП-000957

Торговое наименование лекарственного препарата: Глицифон®

Международное непатентованное наименование или химическое (группировочное) наименование: диглицидил метилфосфонат

Лекарственная форма: мазь для наружного применения

Состав на 100 г мази

Действующее вещество: диглицидил метилфосфонат (глицифон) - 30 г.

Вспомогательные вещества: вазелин, ланолин безводный.

Описание

Мазь от желтого до желто-коричневого или зеленовато-коричневого цвета со специфическим запахом.

Фармакотерапевтическая группа: Противоопухолевое средство

Код АТХ: L01

Фармакологические свойства

Фармакодинамика

Оказывает цитостатическое, противоопухолевое и противомикробное действие. Проявляет контактное действие при опухолях и предопухолевых заболеваниях кожи, избирательно угнетает метаболизм в бластоматозно измененных клетках, что объясняется антимитотическим действием, особенно выраженным в кислой среде опухолевой ткани.

Глицифон уменьшает пролиферативный пул, ингибирует синтез ДНК, влияет на все периоды митотического цикла, вызывая блоки различной глубины и длительности и в наибольшей степени задерживая клетки в фазах G1 и M, а также G2.

На культурах тканей препарат оказывает избирательное цитотоксическое действие на опухолевые клетки, вызывая глубокие дистрофические изменения в них, сопровождающиеся уменьшением содержания нуклеиновых кислот и подавлением активности окислительно-восстановительных ферментов, а также подавляя вступление клеток в митоз и индуцируя различные аномалии их деления.

Фармакокинетика

Фармакокинетика не изучалась.

Показания к применению

- Плоскоклеточный рак кожи 1 стадии;
- Базалиомы (в т.ч. рецидивы после хирургического или лучевого лечения);
- Болезнь Бовена;
- Сенильный кератоз.

Противопоказания

Повышенная чувствительность к компонентам препарата, беременность, период грудного вскармливания, детский возраст.

С осторожностью

С осторожностью наносить препарат на участки кожи, расположенные рядом с периорбитальной областью. Избегать попадание препарата в глаза.

Применение при беременности и в период грудного вскармливания

Применение препарата при беременности и в период грудного вскармливания противопоказано.

Способ применения и дозы

Наружно. Кожу в зоне роста опухоли или кератоза протирают тампоном, смоченным в спирте, затем накладывают 0,8-2 г мази (в зависимости от размера очага) под марлевую салфетку и фиксируют пластырем. При каждой перевязке очаг и окружающую кожу протирают спиртом и удаляют некротизированную ткань. Мазь накладывают один раз в сутки (до 24 ч) до полного разрушения опухолевой ткани.

Продолжительность лечения определяется локализацией и размером очага. При лечении рецидивирующих опухолей, мелкоузелковых форм базалиом в области лба и носа делают 15-20 аппликаций; при язвенных формах, при базалиомах поверхностного типа и болезни Бовена 10-15, при сенильных кератозах 5-10 аппликаций. После завершения лечения на образовавшийся дефект ежедневно накладывают асептические повязки с регенерирующими средствами до полного рубцевания.

Завершенность лечения устанавливается цитологическим исследованием.

Побочное действие

Отек периорбитальной области, гиперемия, зуд и боль в месте нанесения.

Передозировка

Случаев передозировки мази Глицифон® до настоящего времени не выявлено. При случайном попадании лекарственного препарата внутрь, следует провести промывание желудка.

Лечение: симптоматическое.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами

Взаимодействия мази Глицифон® с другими лекарственными средствами не выявлено.

Особые указания

В случае развития гиперемии и отека окружающих тканей, особенно при нанесении мази в периорбитальной области, необходимо сделать перерыв на 2-3 дня и назначить примочки с раствором нитрофурала (фурацилина) или мазь с глюкокортикостероидами, после перерыва лечение продолжают. Снизить интенсивность местных побочных эффектов мази Глицифон® можно сокращением продолжительности ежедневной экспозиции мази на опухоль до 6 часов вместо 24 часов. Во избежание гиперемии и отека предварительно на кожу вокруг опухоли накладывают цинковую пасту. Для уменьшения боли в месте нанесения можно одновременно накладывать на очаг 5-10 % мазь с бензокаином или другими местными анестетиками.

Влияние на способность управлять транспортными средствами, механизмами

Применение препарата не оказывает влияние на управление автотранспортом и занятия потенциально опасными видами деятельности, требующими повышенной концентрации внимания и быстроты психомоторных реакций.

Форма выпуска

Мазь для наружного применения 30 %.

По 10 г во флаконы коричневого стекла. Каждый флакон вместе с инструкцией по применению помещают в пачку из картона.

Условия хранения

В защищенном от света месте, при температуре не выше 20 ^{0}C.

Хранить в недоступном для детей месте.

Срок годности

2 года.

Не применять по истечении срока годности.

Условия отпуска

По рецепту.

Производитель/Адрес места производства/Организация, принимающая претензии потребителей

ОАО «Татхимфармпрепараты», Россия

420091, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Беломорская, д. 260

тел.: (843) 571-85-58; факс: (843) 571-85-38

e-mail: marketing@tatpharm.ru

Генеральный директор
АО «Татхимфармпрепараты» Т.Ш. Ханнанов